Halbjährlicher Bericht HomeCareData

mit ausgewählten Anwendungsbeispielen

Auswertung der Daten vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Organisation: XY

by SwissRDL
19 Mar 2021

Spitex Schweiz
Geschäftsstelle
www.spitex.ch

Effingerstrasse 33
3008 Bern

Telefon 031 381 22 81
info@spitex.ch

Nationale Spitex-Nummer
0842 80 40 20

Übersicht

Register	HomeCareData (homecaredata.memdoc.org)
Analysierte Formulare	Stammdaten und Angaben (SDA; V1) interRAI HomeCare Schweiz (interRAI HC Schweiz; V1) interRAI Community Mental Health Schweiz (interRAI CMH Schweiz, V2) Leistungsplanungsblatt (V1) Formular Entlassung (V1)
Datum Datenexport	15 Mar 2021
Berücksichtigte Einträge	Alle zum Zeitpunkt des Datenexports abgeschlossenen und transferierten Einträge
Bericht erstellt durch	Andreas Boss SwissRDL - Medical Registries and Data Linkage Institut für Sozial- und Präventivmedizin Universität Bern Mittelstrasse 43 3012 Bern
Datum	19 Mar 2021

Einleitung

In diesem Bericht sind ausgewählte Ergebnisse der Daten der eigenen Spitex-Organisation aus HomeCareData (HCD), teilweise im Vergleich mit allen Daten im Pool, abgebildet. Die Ergebnisse können für betriebswirtschaftliche Entscheidungen und für die fachliche Weiterentwicklung genutzt werden.

Der halbjährliche Bericht basiert auf abgeschlossenen Formularen mit vollständigen Daten. Formulare, die unvollständig und nicht abgeschlossen sind, werden nicht in HCD transferiert. Die Formulierungen der einzelnen Themenbereiche und Kodierungen sind identisch mit jenen im Formular Stammdaten und Angaben (SDA), im Abklärungsinstrument interRAI HomeCareSchweiz (interRAI HC Schweiz), im interRAI Community Mental Health Schweiz (interRAI CMH Schweiz), sowie in den Formularen Leistungsplanungsblatt (LPB) und Entlassung.

Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass alle Analysen auf Ebene der Klientinnen und Klienten durchgeführt werden. Gibt es für eine Klientin mehrere Einträge in einem Formular (mit gleicher oder unterschiedlicher Fallnummer) während der entsprechenden Periode (Semester oder Vergleichsperiode), so wird jeweils nur der aktuellste Eintrag berücksichtigt.

Die Interpretation der Ergebnisse obliegt jeder Spitex-Organisation, da sie im Kontext beurteilt werden müssen. Voraussetzung für aussagekräftige Ergebnisse ist die korrekte Anwendung der interRAI Instrumente. Die kurzen Beschreibungen der Abbildungen in diesem Bericht beschränken sich auf Hinweise und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Geschlechterverteilung zeigt, dass die Mehrheit der Personen, die Spitex-Betreuung und -Pflege benötigen, Frauen sind. Aus diesem Grund wird für die bessere Lesbarkeit in diesem Bericht die weibliche Form gewählt.

Darstellung der Ergebnisse

- Zeitraum der Daten wird bei jedem Ergebnis aufgeführt.
- Beschreibung der Filter und gewählten Items aus den interRAI Instrumenten, z.B. aus interRAI HC Schweiz; A12 Form des Zusammenlebens.
- Darstellung in Tabellen und Diagrammen.
- Beschreibungen von Vergleichen erfolgen in Prozentangaben, dem Konfidenzintervall und dem p-Wert. Bitte beachten Sie das Tutorial mit den Erklärungen zu den statistischen Begriffen: https://memcms.memdoc.org/fileadmin/user_upload/Erlaeuterungen_Statistik_de.pdf
- Darstellung der Ergebnisse des halben Jahres sind in absoluten Zahlen beschrieben.

Fragen und Rückmeldungen zum vorliegenden Bericht:

Für die Weiterentwicklung von HCD und des vorliegenden Berichtes sind wir auf Rückmeldungen angewiesen. Für Rückmeldungen und bei Fragen steht Ihnen Esther Bättig, Leitung HCD, wissenschaftliche Mitarbeiterin Grundlagen und Entwicklung, Spitex Schweiz zur Verfügung:
baettig@spitex.ch.
Sie können sich auch an die Mitglieder der Kommission HCD wenden:
https://www.spitex-bedarfsabklaerung.ch/files/TKQW73U/2021_02_25_list_kommission_hcd_dt.pdf

Übersicht Organisationen (SDA)

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Berücksichtigt wurden alle Organisationen mit mindestens einem eingereichten Eintrag im SDA-Formular.

	Diese Periode
Anzahl Organisationen	85
deutschsprachig (%)	78 (91.8%)
französischsprachig (%)	3 (3.5%)
italienischsprachig (%)	0 (0.0%)
Anzahl Klientinnen pro Organisation mit SDA	
Mittelwert (SD*)	194 (155)
Median [1. - 3. Quartil]**	147 (93, 245)

* SD: Standardabweichung

** 1. Quartil - Median - 3. Quartil: 25% aller Org. haben weniger Einträge im SDA als das 1. Quartil, 50% weniger als der Median, und 75% weniger als das 3. Quartil.

Übersicht Formulare - dieses Semester

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1***
SDA	224 (18.9%)	8088 (14.2%)	*0.000*
interRAI HC Schweiz	183 (15.4%)	5189 (9.1%)	*0.000*
interRAI CMH Schweiz	36 (3.0%)	804 (1.4%)	*0.000*
Leistungsplanungsblatt	541 (45.5%)	32890 (57.9%)	*0.000*
Formular Entlassung	204 (17.2%)	9855 (17.3%)	*0.897*

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Stammdaten und Angaben (SDA)

In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse ausgewählter Daten aus dem Formular "Stammdaten und Angaben" (SDA) der eigenen Spitex-Organisation im Vergleich zu allen Daten im Pool aufgeführt.

AA1. Eröffnungsgrund (SDA) - dieses Semester

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1***
Eröffnungsgrund			
Eintritt in die Spitexorganisation	210 (93.8%)	8004 (99.0%)	*0.578*
Einsatzabbruch***	14 (6.3%)	84 (1.0%)	*0.000*

***Einsatzabbruch: in den folgenden Analysen werden Einträge mit Einsatzabbruch nicht mehr berücksichtigt.

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

AA3. Anmeldende Person (SDA) - dieses Semester

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1***
Anmeldend. Person / Institut. (N (%))			
Angehörige	32 (15.2%)	1400 (17.5%)	*0.472*
Hausarzt / amb. ärzt. Dienst	18 (8.6%)	1000 (12.5%)	*0.126*
Spital, stat. Einrichtung inkl. Psych.	80 (38.1%)	3150 (39.4%)	*0.807*
Reha-Klinik	30 (14.3%)	490 (6.1%)	*0.000*
Alters- u. Pflegeheim	3 (1.4%)	112 (1.4%)	
andere Spitexorganisation	1 (0.5%)	69 (0.9%)	
Behörden (z.B. KESB, Sozialdienst)	2 (1.0%)	81 (1.0%)	
Person selber	34 (16.2%)	1486 (18.6%)	*0.464*
Andere	10 (4.8%)	216 (2.7%)	*0.082*

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

BB2. Geschlecht und BB3. Altersverteilung (SDA) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Geschlecht (N (%))			
weiblich	125 (59.5%)	4813 (60.1%)	*0.929*
männlich	85 (40.5%)	3191 (39.9%)	*0.907*
Alter (y)			
Mittelwert (SD***)	68 (18)	71 (17)	*0.003*
Median [1.-3. quart.]****	73 [57, 82]	76 [62, 85]	

*** SD: Standardabweichung

**** 1.Quartil - Median - 3.Quartil: 25% aller Klientinnen sind jünger als das 1. Quartil, 50% jünger als der Median, und 75% jünger als das 3. Quartil

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test (für Häufigkeiten) / ttest (für gemessene Grössen); testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



BB12. Nationalität und BB13. Sprache (SDA) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Nationalität (N (%))			
Schweiz	190 (90.5%)	7293 (91.1%)	*0.945*
Andere	20 (9.5%)	711 (8.9%)	*0.769*
üblicherw. gespr. Sprache (N (%))			
lokal gespr. Sprache	190 (90.5%)	6958 (86.9%)	*0.694*
andere Landessprache	11 (5.2%)	638 (8.0%)	*0.175*
sonstige Sprache	9 (4.3%)	408 (5.1%)	

Falls bei der Sprache detailliertere Angaben benötigt werden, können diese direkt in der Onlinestatistik von HomeCareData abgefragt werden.

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

BB10a. Form des Zusammenlebens (SDA) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Form des Zusammenlebens (N (%))			
alleine	89 (42.4%)	3560 (44.5%)	*0.706*
ausschliesslich mit Partner/in	86 (41.0%)	3054 (38.2%)	*0.586*
mit Partner/in u. anderen	21 (10.0%)	758 (9.5%)	*0.814*
mit Kindern, ohne Partner/in	5 (2.4%)	259 (3.2%)	
mit Eltern o. Erziehungsberechtigten	2 (1.0%)	114 (1.4%)	
mit Geschwistern	1 (0.5%)	48 (0.6%)	
mit anderen Verwandten	1 (0.5%)	58 (0.7%)	
mit Nicht-Verwandten (1 od. mehr)	5 (2.4%)	153 (1.9%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

BB16. Einschätzung der Situation (SDA) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Einschätzung Situation(N (%))			
Somat. Pflege- u. Betr.situation	124 (59.0%)	4016 (50.2%)	*0.156*
Psychiatr. Pflege- u. Betr.situation	18 (8.6%)	582 (7.3%)	*0.509*
Palliat. Pflege- u. Betr.situation	14 (6.7%)	436 (5.4%)	*0.470*
Päd. Pflege- u. Betr.situation		29 (0.4%)	
Isoliert-therapeutische Pflegesituation	26 (12.4%)	1812 (22.6%)	*0.003*
Vorübergehende Betreuungssituation	25 (11.9%)	1052 (13.1%)	*0.644*
Klientin lehnt Bedarfsabklärung ab	3 (1.4%)	77 (1.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

interRAI HC Schweiz (interRAI HC)

In den folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse ausgewählter Daten aus dem Formular "interRAI HC Schweiz" der eignen Spitex-Organisation im Vergleich zu allen Daten im Pool aufgeführt.

A8. Beurteilungsgrund (interRAI HC) - dieses Semester

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1***
Beurteilungsgrund (N (%))			
Erstassessment	55 (30.1%)	1435 (27.7%)	*0.595*
Reassessment	119 (65.0%)	3344 (64.4%)	*0.940*
Wiedereintritt	5 (2.7%)	134 (2.6%)	
Reassessment w. Statusveränd.	4 (2.2%)	250 (4.8%)	
Einsatzabbruch***		18 (0.3%)	
Andere (z.B. Studie)		8 (0.2%)	

***Einsatzabbruch: in den folgenden Analysen werden Einträge mit Einsatzabbruch nicht mehr berücksichtigt.

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

A11. Wohnsituation (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Wohnsituation (N (%))			
Privat	181 (98.9%)	4964 (96.0%)	*0.780*
Wohnung mit integr. Dienstleistungen	1 (0.5%)	161 (3.1%)	
Einrichtung für Pers. m. psych. Probl.		13 (0.3%)	
WG für Pers. mit körp. Behinderung		4 (0.1%)	
Einrichtung f. Pers. mit geist. Behind.		7 (0.1%)	
Psychiatrische Klinik		2 (0.0%)	
Obdachlos (mit/ohne Obdl.unterkunft)			
Alters- und Pflegeheim		5 (0.1%)	
Rehabilitationsklinik		1 (0.0%)	
Hospiz/Palliativstation		1 (0.0%)	
Akutklinik			
Justizvollzuganstalt			
Sonstiges	1 (0.5%)	13 (0.3%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

A12a. Form des Zusammenlebens (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Zusammenleben (N (%))			
Alleine	106 (57.9%)	3037 (58.7%)	*0.911*
mit Partner	56 (30.6%)	1511 (29.2%)	*0.767*
mit Partner + Anderen	10 (5.5%)	221 (4.3%)	*0.458*
mit Kindern (o. Part.)	4 (2.2%)	197 (3.8%)	
mit Eltern	1 (0.5%)	29 (0.6%)	
mit Geschwistern	2 (1.1%)	41 (0.8%)	
mit and. Verwandten	1 (0.5%)	33 (0.6%)	
mit Nicht-Verwandten	3 (1.6%)	102 (2.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

A13. Spitalaufenthalt in den letzten 90 Tagen (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Spitalaufenthalt (N (%))			
kein Spit.aufenthalt in letzt. 90 Tagen	128 (69.9%)	3436 (66.4%)	*0.662*
Spitalaufenthalt vor 31-90 Tagen	9 (4.9%)	591 (11.4%)	
Spitalaufenthalt vor 15-30 Tagen	10 (5.5%)	224 (4.3%)	*0.483*
Spitalaufenthalt vor 8-14 Tagen	11 (6.0%)	160 (3.1%)	*0.035*
Spitalaufenthalt in letzt. 7 Tagen	25 (13.7%)	731 (14.1%)	*0.875*
ist aktuell hospitalisiert		29 (0.6%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

C1. Kognitive Fähigkeiten für alltägliche Entscheidungen (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Kognitive Fähigkeiten (N (%))			
Unabhängig	128 (69.9%)	2946 (57.0%)	*0.080*
Veränderte Unabhängigkeit	24 (13.1%)	1120 (21.7%)	*0.021*
Leichte Beeinträchtigung	17 (9.3%)	668 (12.9%)	*0.197*
Mittlere Beeinträchtigung	7 (3.8%)	264 (5.1%)	
Schwere Beeinträchtigung	7 (3.8%)	172 (3.3%)	
Kein wahrnehmbares Bewusstsein		1 (0.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

In dieser Tabelle wird aufgezeigt, wie die kognitiven Fähigkeiten der Klientinnen für alltägliche Entscheidungen beurteilt wurden, im Vergleich der Daten der eigenen Spitex-Organisation mit allen Daten im Pool.
Mögliche Fragestellungen:
- Bei grossen Abweichungen der Zahlen der eigenen Spitex-Organisation gegenüber dem Pool; wie ist die Kodiersicherheit?
- Wie entwickelt sich die Zahl der Klientinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen im zeitlichen Vergleich?

J6a. Häufigkeit und J6b. Intensität des Schmerzes (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Häufigkeit Schmerz letzt. 3 T. (N (%))			
keine Schmerzen	74 (40.4%)	2389 (46.2%)	*0.341*
vorhanden, jedoch nicht in letzt. 3 T.	30 (16.4%)	659 (12.7%)	*0.210*
an 1 oder 2 Tagen	25 (13.7%)	764 (14.8%)	*0.718*
täglich	54 (29.5%)	1359 (26.3%)	*0.463*
Intensität des Schmerzes (N (%))			
keine Schmerzen	73 (39.9%)	2374 (45.9%)	*0.317*
leichte Schmerzen	41 (22.4%)	977 (18.9%)	*0.333*
mittlere Schmerzen	55 (30.1%)	1387 (26.8%)	*0.468*
starke Schmerzen	12 (6.6%)	379 (7.3%)	*0.713*
Period. m. unerträglichen Schmerzen	2 (1.1%)	54 (1.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Es ist zu beachten: Sowohl für J6a. wie auch J6b. gilt die Beobachtungsperiode von drei Tagen. Deshalb sollte die Anzahl Klientinnen mit Wert «0 – keine Schmerzen» für J6a. und J6b. identisch sein.

Von den 183 Klientinnen der eignen Spitex-Organisation haben 74 keine Schmerzen (J6a. Häufigkeit) und 109 haben mehr oder weniger häufig bis täglich Schmerzen. Bei einem wirksamen Schmerzmanagement lässt sich die Pflegebedürftigkeit und Lebensqualität oftmals positiv beeinflussen. Mit dem Vergleich aller Fälle im Pool kann eingeschätzt werden, ob die Klientinnen der eigenen Spitex-Organisation vermehrt oder weniger unter Schmerzen leiden oder kein Unterschied besteht. Je nachdem lohnen sich Massnahmen bezüglich Kodier-Qualität, Weiterbildungen zum Thema Schmerzen, etc.

J6e. Schmerzkontrolle (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Schmerzkontrolle (N (%))			
Schmerzen kein Thema	70 (38.3%)	2381 (46.0%)	*0.193*
Schmerzen ertragbar, keine Ther. nötig	49 (26.8%)	1058 (20.5%)	*0.101*
Schmerzen ausr. kontrolliert (Ther.)	48 (26.2%)	1304 (25.2%)	*0.812*
Therapie wird nicht immer befolgt	5 (2.7%)	191 (3.7%)	
Ther. befolgt, Schmerzkontr. n. ausr.	10 (5.5%)	202 (3.9%)	*0.311*
keine Ther., Schmerzkontr. n. ausr.	1 (0.5%)	35 (0.7%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Innerhalb der eigenen Organisation geben 38 % der befragten Klientinnen an, keine Schmerzen zu haben. 27 % haben Schmerzen, benötigen jedoch keine Schmerzkontrolle. 26 % haben ein funktionierendes Schmerzmanagement. 3 % hätten Medikamente zur Schmerzbekämpfung, nehmen sie aber nicht ein. In den beiden Gruppen ohne ausreichende Schmerzkontrolle werden in 5 % Medikamente eingenommen, in 1 % gibt es keine Schmerztherapie. Eine Anpassung des Schmerzmanagements ist in diesen beiden Gruppen nötig.

J6a. / J6e. Schmerzkontrolle bei Klientinnen mit Schmerzen an mind. 1 der 3 letzt. T. (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Schmerzkontrolle (N (%))			
Schmerzen kein Thema		50 (1.0%)	
Schmerzen ertragbar, keine Ther. nötig	28 (15.3%)	686 (13.3%)	*0.490*
Schmerzen ausr. kontrolliert (Ther.)	38 (20.8%)	986 (19.1%)	*0.639*
Therapie wird nicht immer befolgt	4 (2.2%)	180 (3.5%)	
Ther. befolgt, Schmerzkontr. n. ausr.	9 (4.9%)	194 (3.8%)	
keine Ther., Schmerzkontr. n. ausr.		27 (0.5%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Anhand dieser Ergebnisse könnte geklärt werden, welche Gründe zu der Einschätzung führten, dass jene Klientinnen und Klienten, die regelmässig unter Schmerzen leiden, keine Anpassung der Schmerztherapie benötigen.

J2. / J1a. aktuelle Stürze (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Stürze in letzten 3 Tagen (N (%))			
kein Sturz	180 (98.4%)	5021 (97.1%)	*0.904*
ein oder mehr Stürze (N (%))	3 (1.6%)	150 (2.9%)	
Stürze im letzten Monat			
kein Sturz	159 (86.9%)	4397 (85.0%)	*0.845*
ein Sturz	22 (12.0%)	629 (12.2%)	*0.959*
zwei oder mehr Stürze	2 (1.1%)	145 (2.8%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Aus den Ergebnissen kann sich die Frage stellen, ob Stürze in der eignen Spitex-Organisation ein wichtiges Thema sind.

J1b. / J1c. Stürze vor einem bis sechs Monaten (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Stürze vor einem bis drei Mnt.			
kein Sturz	158 (86.3%)	4389 (84.9%)	*0.877*
ein Sturz	21 (11.5%)	614 (11.9%)	*0.884*
zwei oder mehr Stürze	4 (2.2%)	168 (3.2%)	
Stürze vor drei bis sechs Mnt.			
kein Sturz	155 (84.7%)	4275 (82.7%)	*0.827*
ein Sturz	20 (10.9%)	661 (12.8%)	*0.512*
zwei oder mehr Stürze	8 (4.4%)	235 (4.5%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Aus den Ergebnissen kann sich die Frage stellen, ob Stürze in der eignen Spitex-Organisation ein wichtiges Thema sind.

I1. Schriftliche somatische Diagnosen bekannt? (IHC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

		eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Schriftl. somat. Diagnosen bekannt				
	Nein	9 (4.9%)	475 (9.2%)	
	Ja	174 (95.1%)	4696 (90.8%)	*0.670*

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

I2a. - I2u. Die vier häufigsten schriftl. Diagnosen des Pools - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Diagnose	Eigene Organisation			Pool		
Level*	Rang	N**	% [95%-KI]***	Rang	N**	% [95%-KI]***
Koron. Herzerkrankung (KHK)	**2**	**34**	**20% [14 - 26%]**	**1**	**1373**	**29% [28 - 31%]**
1		9	5% [3 - 10%]		280	6% [5 - 7%]
2		20	11% [8 - 17%]		798	17% [16 - 18%]
3		5	3% [1 - 7%]		295	6% [6 - 7%]
Diabetes mellitus	**3**	**34**	**20% [14 - 26%]**	**2**	**1088**	**23% [22 - 24%]**
1		7	4% [2 - 8%]		269	6% [5 - 6%]
2		20	11% [8 - 17%]		570	12% [11 - 13%]
3		7	4% [2 - 8%]		249	5% [5 - 6%]
Herzinsuffizienz	**1**	**53**	**30% [24 - 38%]**	**3**	**1056**	**22% [21 - 24%]**
1		10	6% [3 - 10%]		210	4% [4 - 5%]
2		37	21% [16 - 28%]		585	12% [12 - 13%]
3		6	3% [2 - 7%]		261	6% [5 - 6%]
Krebserkrankung	**5**	**25**	**14% [10 - 20%]**	**4**	**782**	**17% [16 - 18%]**
1		6	3% [2 - 7%]		309	7% [6 - 7%]
2		8	5% [2 - 9%]		114	2% [2 - 3%]
3		11	6% [4 - 11%]		359	8% [7 - 8%]

*Level: Legende:
1 = Hauptdiagnose, Grund der jetzigen Behandlung
2 = Diagnose vorhanden, aktive Behandlung
3 = Diagnose vorhanden, unter Beobachtung, aber keine aktive Behandlung

**N: Anzahl der entsprechenden Diagnose

*** %: Prozentualer Anteil der Diagnose an allen Einträgen, bei denen schriftliche Diagnosen vorhanden sind. [95%-KI]: 95% Konfidenz-Intervall.

I2A. - I2U. Die vier häufigsten schriftl. Diagnosen der Organisation - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Diagnose		Eigene Organisation			Pool		
	Level*	Rang	N**	% [95%-KI]***	Rang	N**	% [95%-KI]***
Herzinsuffizienz		**1**	**53**	**30% [24 - 38%]**	**3**	**1056**	**22% [21 - 24%]**
	1		10	6% [3 - 10%]		210	4% [4 - 5%]
	2		37	21% [16 - 28%]		585	12% [12 - 13%]
	3		6	3% [2 - 7%]		261	6% [5 - 6%]
Koron. Herzerkrankung (KHK)		**2**	**34**	**20% [14 - 26%]**	**1**	**1373**	**29% [28 - 31%]**
	1		9	5% [3 - 10%]		280	6% [5 - 7%]
	2		20	11% [8 - 17%]		798	17% [16 - 18%]
	3		5	3% [1 - 7%]		295	6% [6 - 7%]
Diabetes mellitus		**3**	**34**	**20% [14 - 26%]**	**2**	**1088**	**23% [22 - 24%]**
	1		7	4% [2 - 8%]		269	6% [5 - 6%]
	2		20	11% [8 - 17%]		570	12% [11 - 13%]
	3		7	4% [2 - 8%]		249	5% [5 - 6%]
Demenz (nicht Alzh.)		**4**	**26**	**15% [10 - 21%]**	**5**	**696**	**15% [14 - 16%]**
	1		14	8% [5 - 13%]		376	8% [7 - 9%]
	2		5	3% [1 - 7%]		88	2% [2 - 2%]
	3		7	4% [2 - 8%]		232	5% [4 - 6%]

*Level: Legende:
1 = Hauptdiagnose, Grund der jetzigen Behandlung
2 = Diagnose vorhanden, aktive Behandlung
3 = Diagnose vorhanden, unter Beobachtung, aber keine aktive Behandlung

**N: Anzahl der entsprechenden Diagnose

*** %: Prozentualer Anteil der Diagnose an allen Einträgen, bei denen schriftliche Diagnosen vorhanden sind. [95%-KI]: 95% Konfidenz-Intervall.

Klinische Assessment Protokolle (CAPs)

In den folgenden Abbildungen wird zunächst die prozentuale Verteilung der Stufen aller CAPs grafisch dargestellt. Danach werden die CAPs, welche am häufigsten triggerten (Stufe > 0) tabellarisch zusammengefasst. Die Bedeutung der verschiedenen Stufen ist abhängig vom jeweiligen CAP und ist im interRAI-CAP-Handbuch beschrieben.

CAPs funktionelle Leistungsfähigkeit (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020



Gezeigt sind Mittelwert und 95%-Konfidenzintervall.

CAPs Kognition / psychische Gesundheit (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020



Gezeigt sind Mittelwert und 95%-Konfidenzintervall.

CAPs Sozialleben (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020



Gezeigt sind Mittelwert und 95%-Konfidenzintervall.

CAPs klinische Probleme I (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020



Gezeigt sind Mittelwert und 95%-Konfidenzintervall.

CAPs klinische Probleme II (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020



Gezeigt sind Mittelwert und 95%-Konfidenzintervall.

ACHTUNG bei CAP Urininkontinenz: im Gegensatz zu allen anderen CAPs bedeutet hier neben Stufe 0 auch die Stufe 1 "nicht ausgelöst".

Die vier häufigsten CAPs des Pools - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Hier werden die vier am häufigsten ausgelösten CAPs (Wert > 0) des Pools mit denselben CAPs der eigenen Organisation verglichen.

CAP	Level	Eigene Organisation Rang	Eigene Organisation N Probl.*	Eigene Organisation % Probl.* [95%-KI]**	Pool Rang	Pool N Probl.*	Pool % Probl.* [95%-KI]**
Verl. kogn. Fgkt.		**1**	**170**	**93% [88 - 96%]**	**1**	**4677**	**91% [90 - 92%]**
	1		159	87% [81 - 91%]		4056	79% [78 - 80%]
	2		11	6% [3 - 10%]		621	12% [11 - 13%]
Inf. Unterst.		**3**	**94**	**51% [44 - 59%]**	**2**	**2589**	**50% [49 - 52%]**
	1		94	51% [44 - 59%]		2589	50% [49 - 52%]
Kardio-pulm. Erkr.		**2**	**95**	**52% [45 - 59%]**	**3**	**2591**	**50% [49 - 51%]**
	1		95	52% [45 - 59%]		2591	50% [49 - 51%]
Stimmungslage		**5**	**63**	**34% [28 - 42%]**	**4**	**1962**	**38% [37 - 40%]**
	1		50	27% [21 - 34%]		1207	24% [23 - 25%]
	2		13	7% [4 - 12%]		755	15% [14 - 16%]

* Anzahl (N Probl.) und Prozentwert (% Probl.) der Klientinnen mit CAP-Wert > 0 (resp. CAP-Wert > 1 für CAP Urininkontinenz)

** 95% Konfidenz-Intervall (95%-KI)

Die vier häufigsten CAPs der Organisation - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Hier werden die vier am häufigsten ausgelösten CAPs (Wert>0) innerhalb der eigenen Organisation mit denselben CAPs des Pools verglichen.

		Eigene Organisation			Pool		
CAP	Level	**Rang**	**N Probl.***	**% Probl.*** [95%-KI]**	**Rang**	**N Probl.***	**% Probl.*** [95%-KI]**
Verl. kogn. Fgkt.		**1**	**170**	**93% [88 - 96%]**	**1**	**4677**	**91% [90 - 92%]**
	1		159	87% [81 - 91%]		4056	79% [78 - 80%]
	2		11	6% [3 - 10%]		621	12% [11 - 13%]
Kardio-pulm. Erkr.		**2**	**95**	**52% [45 - 59%]**	**3**	**2591**	**50% [49 - 51%]**
	1		95	52% [45 - 59%]		2591	50% [49 - 51%]
Inf. Unterst.		**3**	**94**	**51% [44 - 59%]**	**2**	**2589**	**50% [49 - 52%]**
	1		94	51% [44 - 59%]		2589	50% [49 - 52%]
BADL		**4**	**69**	**38% [31 - 45%]**	**5**	**1890**	**38% [36 - 39%]**
	1		24	13% [9 - 19%]		688	14% [13 - 15%]
	2		45	25% [19 - 32%]		1202	24% [23 - 25%]

* Anzahl (N Probl.) und Prozentwert (% Probl.) der Klientinnen mit CAP-Wert > 0 (resp. CAP-Wert > 1 für CAP Urininkontinenz)

** 95% Konfidenz-Intervall (95%-KI)

ADL Hierarchy Scale (IHC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Hierarchie-Skala der Aktivitäten des Täglichen Lebens (ADL). Mass der funktionellen Leistungsfähigkeit, das die Fähigkeit einer Person zeigt, Alltagstätigkeiten auszuführen.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
ADL Hierarchy Scale (N (%))			
0 = unabhängig	113 (61.7%)	3068 (59.3%)	*0.743*
1 = Aufsicht erforderlich	17 (9.3%)	395 (7.6%)	*0.449*
2 = begrenzte Beeinträchtigung	26 (14.2%)	832 (16.1%)	*0.559*
3 = umfass. Unterst. erforderl. - 1	19 (10.4%)	462 (8.9%)	*0.541*
4 = umfass. Unterst. erforderl. - 2	5 (2.7%)	156 (3.0%)	
5 = abhängig	3 (1.6%)	226 (4.4%)	
6 = völlige Abhängigkeit		32 (0.6%)	
7 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



ADL Long Form (ADLLF) Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

ADL Long Form (ADLLF) Scale; BADL Hierarchieskala — Lange Version.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
ADL Long Form Scale (N (%))			
0= Keine ADL-Beeinträchtigung	100 (54.6%)	2479 (47.9%)	*0.301*
1	12 (6.6%)	202 (3.9%)	*0.088*
2	15 (8.2%)	530 (10.2%)	*0.411*
3	4 (2.2%)	228 (4.4%)	
4	12 (6.6%)	357 (6.9%)	*0.865*
5	6 (3.3%)	165 (3.2%)	
6	9 (4.9%)	247 (4.8%)	
7	3 (1.6%)	129 (2.5%)	
8	6 (3.3%)	111 (2.1%)	
9	4 (2.2%)	103 (2.0%)	
10	2 (1.1%)	75 (1.5%)	
11	2 (1.1%)	64 (1.2%)	
12	2 (1.1%)	58 (1.1%)	
13	1 (0.5%)	43 (0.8%)	
14		35 (0.7%)	
15	2 (1.1%)	41 (0.8%)	
16		41 (0.8%)	
17	2 (1.1%)	25 (0.5%)	
18		31 (0.6%)	
19		23 (0.4%)	
20		25 (0.5%)	
21		29 (0.6%)	
22		14 (0.3%)	
23		27 (0.5%)	
24		19 (0.4%)	
25	1 (0.5%)	16 (0.3%)	
26		13 (0.3%)	
27		10 (0.2%)	
28 = Hohe ADL-Beeinträchtigung		31 (0.6%)	
29 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.


ADL Long Form Scale
%
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Skalen-Wert
Org.
Pool

ADL Short Form (ADLSF) Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

ADL Short Form (ADLSF) Scale; BADL Hierarchieskala — Kurze Version.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
ADL Short Form Scale (N (%))			
0= Keine ADL-Beeinträchtigung	113 (61.7%)	3067 (59.3%)	*0.741*
1	13 (7.1%)	343 (6.6%)	*0.815*
2	24 (13.1%)	624 (12.1%)	*0.707*
3	13 (7.1%)	279 (5.4%)	*0.347*
4	4 (2.2%)	210 (4.1%)	
5	5 (2.7%)	98 (1.9%)	
6	1 (0.5%)	106 (2.0%)	
7	3 (1.6%)	68 (1.3%)	
8	2 (1.1%)	49 (0.9%)	
9	2 (1.1%)	70 (1.4%)	
10	1 (0.5%)	53 (1.0%)	
11	1 (0.5%)	60 (1.2%)	
12		31 (0.6%)	
13		25 (0.5%)	
14	1 (0.5%)	28 (0.5%)	
15		28 (0.5%)	
16 = Hohe ADL-Beeinträchtigung		32 (0.6%)	
17 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Aggressive Behaviour Scale (ABS) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Aggressive Behaviour Scale (ABS); Skala des aggressiven Verhaltens. Messung der Häufigkeit und Verschiedenartigkeit des aggressiven Verhaltens.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Aggressive Behaviour Scale (N (%))			
0 = keine Anz. von Aggress.	172 (94.0%)	4645 (89.8%)	*0.675*
1 = leichte bis mittelgrad. Aggress.	4 (2.2%)	213 (4.1%)	
2 =leichte bis mittelgrad. Aggress.	5 (2.7%)	157 (3.0%)	
3 = leichte bis mittelgrad. Aggress.	1 (0.5%)	77 (1.5%)	
4=leichte bis mittelgrad. Aggress.		25 (0.5%)	
5 = schwerere Aggression		13 (0.3%)	
6 = schwerere Aggression		4 (0.1%)	
7 = schwerere Aggression		8 (0.2%)	
8 = schwerere Aggression		2 (0.0%)	
9 = schwerere Aggression		1 (0.0%)	
10 = schwerere Aggression		1 (0.0%)	
11 = schwerere Aggression			
12 = schwerere Aggression			
13 = konnte nicht berechnet werden	1 (0.5%)	25 (0.5%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Cognitive Performance Scale 2 (CPS 2) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die kognitive Leistungsskala Version zwei (CPS 2) beschreibt den kognitiven Zustand. Sie wurde entwickelt, um frühzeitig Rückgänge in der Kapazität einiger IADL -Aktivitäten zu erkennen.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
CPS 2 (N (%))			
0 = intakt 1	57 (31.1%)	855 (16.5%)	*0.000*
1 = intakt 2	53 (29.0%)	1705 (33.0%)	*0.413*
2 = beinahe intakt 1	28 (15.3%)	1061 (20.5%)	*0.152*
3 = beinahe intakt 2	30 (16.4%)	853 (16.5%)	*0.975*
4 = mittelgr. Beeinträchtigung 1	5 (2.7%)	346 (6.7%)	
5 = mittelgr. Beeinträchtigung 2	3 (1.6%)	148 (2.9%)	
6 = schwere Beeinträchtigung 1	6 (3.3%)	92 (1.8%)	
7 = schwere Beeinträchtigung 2		57 (1.1%)	
8 = sehr schwere Beeinträchtigung	1 (0.5%)	53 (1.0%)	
9 = konnte nicht berechnet werden		1 (0.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Cognitive Performance Scale 1 (CPS 1) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die kognitive Leistungsskala beschreibt den kognitiven Status der Person.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
CPS 1 (N (%))			
0 = intakt	110 (60.1%)	2560 (49.5%)	*0.114*
1 = beinahe intakt	29 (15.8%)	1093 (21.1%)	*0.154*
2 = leichte Beeinträchtigung	31 (16.9%)	1074 (20.8%)	*0.300*
3 = mittelgradige Beeinträchtigung	6 (3.3%)	241 (4.7%)	
4 = mittelgr. od. schwere Beeintr.		30 (0.6%)	
5 = schwere Beeinträchtigung	7 (3.8%)	149 (2.9%)	
6 = sehr schwere Beeinträchtigung		23 (0.4%)	
7 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Communication Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die Kommunikationsskala fasst die zwei Items der verbalen und non-verbalen Kommunikation zusammen. Seh- und Hörvermögen sind in dieser Skala nicht enthalten. Ziel dieser Skala sind vor allem Dysphasie (Sprachstörungen, Verständnis und Ausdruck) und ähnliche Syndrome.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Communication Scale (N (%))			
0 = intakt	155 (84.7%)	3657 (70.7%)	*0.105*
1 = intakt im Grenzbereich	15 (8.2%)	629 (12.2%)	*0.144*
2 = leichte Beeinträchtigung	8 (4.4%)	447 (8.6%)	
3 = leichte/mittelgr. Beeintr.	2 (1.1%)	185 (3.6%)	
4 = mittelgradige Beeinträchtigung	1 (0.5%)	98 (1.9%)	
5 = mittelgr./schwere Beeintr.		55 (1.1%)	
6 = schwere Beeinträchtigung		54 (1.0%)	
7 = schwere/sehr schw. Beeintr.	2 (1.1%)	23 (0.4%)	
8 = sehr schwere Beeinträchtigung		22 (0.4%)	
9 = konnte nicht berechnet werden		1 (0.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Deafblind Severity Index (DBSI) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Index der Schwere der Hör- und Sehbeeinträchtigung (DBSI). Höhere Skalenwerte stellen eine stärkere Beeinträchtigung der Sinne dar.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Deafblind Severity Index (N (%))			
0 = beide Sinne intakt	109 (59.6%)	3185 (61.6%)	*0.785*
1 = 1. intakt, 2. leicht/mittelgr. beeintr.	55 (30.1%)	1286 (24.9%)	*0.227*
2 = 1. intakt, 2. stark beeintr.	5 (2.7%)	127 (2.5%)	
3 = beide Sinne leicht/mittelgr. beeintr.	11 (6.0%)	477 (9.2%)	*0.170*
4 = 1. leicht/mittelgr., 2. stark beeintr.	3 (1.6%)	89 (1.7%)	
5 = beide Sinne stark beeinträchtigt		6 (0.1%)	
6 = konnte nicht berechnet werden		1 (0.0%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Depression Rating Scale (DRS) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die Depressions-Ratingskala (DRS) beschreibt den Stimmungsstatus einer Person. Punktzahlen von 3 oder höher weisen auf grössere oder kleinere depressive Störungen hin.

		eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Depression Rating Scale (N (%))				
	0	120 (65.6%)	3140 (60.7%)	*0.521*
	1	30 (16.4%)	777 (15.0%)	*0.664*
	2	20 (10.9%)	430 (8.3%)	*0.255*
	3	3 (1.6%)	267 (5.2%)	
	4	6 (3.3%)	181 (3.5%)	
	5	3 (1.6%)	114 (2.2%)	
	6	1 (0.5%)	65 (1.3%)	
	7		42 (0.8%)	
	8		42 (0.8%)	
	9		15 (0.3%)	
	10		17 (0.3%)	
	11		5 (0.1%)	
	12		2 (0.0%)	
	13		5 (0.1%)	
	14			
	15 = konnte nicht berechnet werden		69 (1.3%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Detection of Indicators and Vulnerabilities for Emergency Room Trips (DIVERT) Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Höhere Punktzahlen geben ein höheres Risiko einer ungeplanten Inanspruchnahme des Notdienstes innerhalb von 6 Monaten nach dem Assessment an.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
DIVERT Scale (N (%))			
1 = niedrigstes Risiko	43 (23.5%)	1270 (24.6%)	*0.797*
2	46 (25.1%)	1614 (31.2%)	*0.195*
3	37 (20.2%)	853 (16.5%)	*0.268*
4	27 (14.8%)	598 (11.6%)	*0.246*
5	17 (9.3%)	434 (8.4%)	*0.694*
6 = höchstes Risiko	13 (7.1%)	285 (5.5%)	*0.386*
7 = konnte nicht berechnet werden		117 (2.3%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Risk of Falls (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Diese Skala zeigt das Sturzrisiko an.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Risk of Falls (N (%))			
0 = Kein Sturz ltz. 90 Tage	139 (76.0%)	3907 (75.6%)	*0.963*
1 = Keiner ltz. 30 T., Sturz vor 31-90 T.	20 (10.9%)	490 (9.5%)	*0.552*
2 = Ein Sturz ltz. 30 Tage	22 (12.0%)	629 (12.2%)	*0.959*
3 = 2+ Stürze ltz. 30 Tage	2 (1.1%)	145 (2.8%)	
4 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



ADL-IADL Functional Hierarchy Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

ADL-IADL Functional Hierarchy Scale; Die BADL-IADL Functional Hierarchy Skala ist eine Synthese der BADL-Hierarchieskala und der Skala der IADL-Fähigkeit (IADLCapacity Hierarchy Scale).

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
ADL-IADL Funct. H. Scale (N (%))			
0 = OK	11 (6.0%)	243 (4.7%)	*0.437*
1 = IADL früh 1	30 (16.4%)	360 (7.0%)	*0.000*
2 = IADL früh 2	43 (23.5%)	941 (18.2%)	*0.139*
3 = einige IADL mittel 1	17 (9.3%)	950 (18.4%)	*0.007*
4 = IADL mittel 1	16 (8.7%)	560 (10.8%)	*0.418*
5 = IADL abhängig	12 (6.6%)	357 (6.9%)	*0.865*
6 = 4 IADL-ADL trans 1	18 (9.8%)	584 (11.3%)	*0.581*
7 = 5 IADL-ADL trans 2	9 (4.9%)	300 (5.8%)	
8 = early ADL	19 (10.4%)	462 (8.9%)	*0.541*
9 = einige ADL mittel 1	5 (2.7%)	156 (3.0%)	
10 = einige ADL mittel 1	3 (1.6%)	226 (4.4%)	
11 = abhängig ADL		32 (0.6%)	
12 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



IADL Capacity Hierarchy Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Capacity Hierarchy Scale; Fähigkeitsskala instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens (IADL). Schätzung des höchsten Funktionsniveaus: Spiegelt die Wahrnehmung der Fähigkeit der Person, IADL durchzuführen, durch andere wider.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
IADL capacity Hierar. Scale (N (%))			
0 = OK - keine Schwierigkeit	11 (6.0%)	264 (5.1%)	*0.606*
1 = einige Schwierigkeiten 1	33 (18.0%)	395 (7.6%)	*0.000*
2 = einige Schwierigkeiten 2-3	48 (26.2%)	1055 (20.4%)	*0.128*
3 = einige Schwierigkeiten 4 plus	17 (9.3%)	663 (12.8%)	*0.208*
4 = gewisse Abhängigkeit	17 (9.3%)	744 (14.4%)	*0.086*
5 = hohe Abhängigkeit	35 (19.1%)	1181 (22.8%)	*0.343*
6 = völlige Abhängigkeit	22 (12.0%)	869 (16.8%)	*0.141*
7 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Method for Assigning Priority Levels (MAPLE) Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Mit der Methode „MAPLE“ (Methode zur Zuordnung von prioritärem Setting) wird die Person durch Ähnlichkeit mit anderen eingestuft, die nach der Beurteilung der Erbringer von häuslichen Pflegeleistungen wahrscheinlich in einer anderen Umgebung eine bessere Pflege erhalten. Auch in Verbindung mit einer Notlage des Betreuers und Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
MAPLE Scale (N(%))			
1 = niedrig	76 (41.5%)	1247 (24.1%)	*0.000*
2 = leicht	9 (4.9%)	437 (8.5%)	
3 = mässig	50 (27.3%)	1727 (33.4%)	*0.214*
4 = hoch	40 (21.9%)	1378 (26.6%)	*0.263*
5 = sehr hoch	7 (3.8%)	311 (6.0%)	
6 = konnte nicht berechnet werden	1 (0.5%)	71 (1.4%)	

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Pain Scale (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die Schmerzskala fasst die beiden Items zusammen, die die beschriebene Intensität und Häufigkeit der Schmerzen beurteilen.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Pain Scale (N (%))			
0 = keine Schmerzen	74 (40.4%)	2389 (46.2%)	*0.341*
1 = nicht tägl. auftr. Schmerzen	55 (30.1%)	1423 (27.5%)	*0.574*
2 = täglich Schmerzen, nicht stark	41 (22.4%)	1032 (20.0%)	*0.511*
3 = täglich starke Schmerzen	11 (6.0%)	285 (5.5%)	*0.784*
4 = täglich quälende Schmerzen	2 (1.1%)	42 (0.8%)	
5 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



Pressure Ulcer Risk Scale (PURS) (interRAI HC) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Die Skala PURS dient der Feststellung des Dekubitus-Risikos.

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Pressure Ulcer Risk Scale (N (%))			
0 = sehr geringes Risiko	97 (53.0%)	2640 (51.1%)	*0.769*
1 = geringes Risiko	62 (33.9%)	1549 (30.0%)	*0.411*
2 = geringes Risiko	17 (9.3%)	583 (11.3%)	*0.451*
3 = mittleres Risiko	6 (3.3%)	209 (4.0%)	
4 = hohes Risiko	1 (0.5%)	116 (2.2%)	
5 = hohes Risiko		56 (1.1%)	
6 = sehr hohes Risiko		17 (0.3%)	
7 = sehr hohes Risiko		1 (0.0%)	
8 = sehr hohes Risiko			
9 = konnte nicht berechnet werden			

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.



A8. Beurteilungsgrund (interRAI CMH) - dieses Semester

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1***
Beurteilungsgrund (N (%))			
Erstassessment	14 (38.9%)	245 (30.5%)	*0.450*
Reassessment	19 (52.8%)	508 (63.2%)	*0.533*
Wiedereintritt	1 (2.8%)	23 (2.9%)	
Reassessment w. Statusveränd.		25 (3.1%)	
Einsatzabbruch***	2 (5.6%)	3 (0.4%)	
Andere (z.B. Studie)			

***Einsatzabbruch: in den folgenden Analysen werden Einträge mit Einsatzabbruch nicht mehr berücksichtigt.

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.

Die 30 häufigsten Leistungen des Pools - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Hier werden die 30 häufigsten prospektiven Leistungen aller Leistungsplanungsblätter des Pools mit denselben Leistungen der eigenen Organisation verglichen.

	Eigene Organisation			Pool		
Leistung	R*	Anzahl	% [95%-KI]*	R*	Anzahl	% [95%-KI]*
Pflegebedarf bestimmen und evaluieren	1	1138	16% [15 - 16%]	1	70992	10% [10 - 10%]
Konsultation Arzt – Spitex zur Bedarfsabklärung	3	540	7% [7 - 8%]	2	66290	9% [9 - 9%]
Reassessment	4	447	6% [6 - 7%]	3	44032	6% [6 - 6%]
Pflegeplanung erstmalig im Rahmen der Bedarfsabklärung	6	272	4% [3 - 4%]	4	36978	5% [5 - 5%]
Ganzwäsche in Bad, Dusche oder am Lavabo	5	287	4% [3 - 4%]	5	28500	4% [4 - 4%]
Medikamente richten	7	249	3% [3 - 4%]	6	28327	4% [4 - 4%]
Pflegeanleitung/Beratung Klientin oder Angehörige	2	577	8% [7 - 9%]	7	28306	4% [4 - 4%]
Blutdruckmessung	19	97	1% [1 - 2%]	8	19925	3% [3 - 3%]
Erstassessment	8	243	3% [3 - 4%]	9	18866	3% [3 - 3%]
Koordination	14	126	2% [1 - 2%]	10	18461	3% [3 - 3%]
Verabreichung gerichtete Medikamente	10	220	3% [3 - 3%]	11	18408	3% [3 - 3%]
Pulskontrolle	74	6	0% [0 - 0%]	12	16972	2% [2 - 2%]
nicht aufgef. Leistungen Pflege und Betreuung	37	43	1% [0 - 1%]	13	16939	2% [2 - 2%]
Gewichtskontrolle	27	57	1% [1 - 1%]	14	14912	2% [2 - 2%]
Kompressionsstrümpfe/-verband	13	150	2% [2 - 2%]	15	13529	2% [2 - 2%]
Teilwäsche am Lavabo (inkl. Intimpflege)	17	105	1% [1 - 2%]	16	12662	2% [2 - 2%]
Kontrollbesuch	36	48	1% [0 - 1%]	17	12017	2% [2 - 2%]
Haare waschen	18	100	1% [1 - 2%]	18	10400	1% [1 - 2%]
Kleiner Verband	16	107	1% [1 - 2%]	19	10116	1% [1 - 1%]
nicht aufgef. hauswirt. Leistungen	9	239	3% [3 - 4%]	20	10045	1% [1 - 1%]
Küche/Bad reinigen	11	197	3% [2 - 3%]	21	9815	1% [1 - 1%]
s.c. oder i.m. Medikamentenverabreichung	32	54	1% [1 - 1%]	22	9203	1% [1 - 1%]
Haut einreiben (therapeutisch verordnet)	12	167	2% [2 - 3%]	23	8269	1% [1 - 1%]
Mittlerer Verband	20	97	1% [1 - 2%]	24	7348	1% [1 - 1%]
Bedarfsabklärung Hauswirtschaft	38	39	1% [0 - 1%]	25	7064	1% [1 - 1%]
Dienstleistungsbedarf Hauswirtschaft bestimmen im Rahmen der Bedarfsabklärung (Leistungskatalog)	15	124	2% [1 - 2%]	26	7023	1% [1 - 1%]
Hilfe An-/Auskleiden	24	65	1% [1 - 1%]	27	6695	1% [1 - 1%]
Kapillarblutentnahme incl. Glucosebestimmung	50	23	0% [0 - 0%]	28	6022	1% [1 - 1%]
Bett frisch beziehen	22	90	1% [1 - 2%]	29	5954	1% [1 - 1%]
Wochenkehr 3-Zimmer-Wohnung	23	69	1% [1 - 1%]	30	5559	1% [1 - 1%]

*R: Rang innerhalb eigener Organisation oder Pool

**% [95%-KI]: Prozentwert der entsprechenden Leistung gemessen an allen Leistungen und 95% Konfidenz-Intervall

Die 30 häufigsten Leistungen berechnen sich aus den Daten aller Leistungsplanungsblätter des letzten halben Jahres. In den Leistungsplanungsblätter werden die prospektiven Leistungen festgehalten. Diese könnten beispielsweise mit den effektiv erbrachten Leistungen aus dem Abrechnungssystem verglichen werden.

Mit den 30 häufigsten geplanten Leistungen aller Daten im Pool kann verglichen werden, ob die eigene Organisation andere Leistungen öfters plant als die anderen.

Die 30 häufigsten Leistungen der eigenen Organisation - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

Hier werden die 30 häufigsten prospektiven Leistungen aller Leistungsplanungsblätter der eigenen Organisation mit denselben Leistungen des Pools verglichen.

	Eigene Organisation			Pool		
Leistung	R*	Anzahl	% [95%-KI]*	R*	Anzahl	% [95%-KI]*
Pflegebedarf bestimmen und evaluieren	1	1138	16% [15 - 16%]	1	70992	10% [10 - 10%]
Pflegeanleitung/Beratung Klientin oder Angehörige	2	577	8% [7 - 9%]	7	28306	4% [4 - 4%]
Konsultation Arzt – Spitex zur Bedarfsabklärung	3	540	7% [7 - 8%]	2	66290	9% [9 - 9%]
Reassessment	4	447	6% [6 - 7%]	3	44032	6% [6 - 6%]
Ganzwäsche in Bad, Dusche oder am Lavabo	5	287	4% [3 - 4%]	5	28500	4% [4 - 4%]
Pflegeplanung erstmalig im Rahmen der Bedarfsabklärung	6	272	4% [3 - 4%]	4	36978	5% [5 - 5%]
Medikamente richten	7	249	3% [3 - 4%]	6	28327	4% [4 - 4%]
Erstassessment	8	243	3% [3 - 4%]	9	18866	3% [3 - 3%]
nicht aufgef. hauswirt. Leistungen	9	239	3% [3 - 4%]	20	10045	1% [1 - 1%]
Verabreichung gerichtete Medikamente	10	220	3% [3 - 3%]	11	18408	3% [3 - 3%]
Küche/Bad reinigen	11	197	3% [2 - 3%]	21	9815	1% [1 - 1%]
Haut einreiben (therapeutisch verordnet)	12	167	2% [2 - 3%]	23	8269	1% [1 - 1%]
Kompressionsstrümpfe/-verband	13	150	2% [2 - 2%]	15	13529	2% [2 - 2%]
Koordination	14	126	2% [1 - 2%]	10	18461	3% [3 - 3%]
Dienstleistungsbedarf Hauswirtschaft bestimmen im Rahmen der Bedarfsabklärung (Leistungskatalog)	15	124	2% [1 - 2%]	26	7023	1% [1 - 1%]
Kleiner Verband	16	107	1% [1 - 2%]	19	10116	1% [1 - 1%]
Teilwäsche am Lavabo (inkl. Intimpflege)	17	105	1% [1 - 2%]	16	12662	2% [2 - 2%]
Haare waschen	18	100	1% [1 - 2%]	18	10400	1% [1 - 2%]
Blutdruckmessung	19	97	1% [1 - 2%]	8	19925	3% [3 - 3%]
Mittlerer Verband	20	97	1% [1 - 2%]	24	7348	1% [1 - 1%]
Unterstützende Massnahmen, Gespräch mit Klientin/Angehörigen (wenn separate Dienstleistung)	21	96	1% [1 - 2%]	82	820	0% [0 - 0%]
Bett frisch beziehen	22	90	1% [1 - 2%]	29	5954	1% [1 - 1%]
Wochenkehr 3-Zimmer-Wohnung	23	69	1% [1 - 1%]	30	5559	1% [1 - 1%]
Hilfe An-/Auskleiden	24	65	1% [1 - 1%]	27	6695	1% [1 - 1%]
Erarbeiten und Einüben von Bewältigungsstrategien	25	62	1% [1 - 1%]	38	3925	1% [1 - 1%]
Hauswirtschaftsplanung erstmalig im Rahmen der Bedarfsabklärung	26	60	1% [1 - 1%]	31	5550	1% [1 - 1%]
Gewichtskontrolle	27	57	1% [1 - 1%]	14	14912	2% [2 - 2%]
Planen, Organisation, Koordination der Behandlung mit Arzt und anderen Diensten, Behörden	28	57	1% [1 - 1%]	34	4549	1% [1 - 1%]
Wochenkehr 4-Zimmer-Wohnung	29	56	1% [1 - 1%]	37	3955	1% [1 - 1%]
Beratung / Anleitung mit Person	30	56	1% [1 - 1%]	44	3192	0% [0 - 0%]

*R: Rang innerhalb eigener Organisation oder Pool

**% [95%-KI]: Prozentwert der entsprechenden Leistung gemessen an allen Leistungen und 95% Konfidenz-Intervall

Z2. Entlassung nach (Entlassung) - diese Periode

Diese Periode: 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	eigene Org.	Pool	*p-Wert 1**
Entlassung nach (N (%))			
Privathaus / Wohnung / Zimmer	146 (71.6%)	5073 (51.5%)	*0.003*
Wohng. m. integr. Dienstleistungen	1 (0.5%)	72 (0.7%)	
Einr. f. Prs. m. psy. Prbl. (Wohngr.)	1 (0.5%)	51 (0.5%)	
WG f. Pers. m. körperl. Behinderung		22 (0.2%)	
Einr. f. Pers. m. geist. Behinderung		20 (0.2%)	
Psych. Klinik oder Abteilung	4 (2.0%)	57 (0.6%)	
Obdachlos (m./ohne Obdachl.unterk.)		2 (0.0%)	
Alters- und Pflegeheim	14 (6.9%)	992 (10.1%)	*0.166*
Rehabilitationsklinik/-abteilung		36 (0.4%)	
Hospiz/Palliativstation	2 (1.0%)	103 (1.0%)	
Akutklinik/-abteilung	14 (6.9%)	604 (6.1%)	*0.686*
Justizvollzugsanstalt		5 (0.1%)	
Sonstiges		5 (0.1%)	
Verstorben***	20 (9.8%)	1120 (11.4%)	*0.532*

*** Verstorben: Hier ist zu beachten, dass die Kodierung «14 = Verstorben» nur gewählt werden soll, wenn die Klientin zuhause verstorben ist.

* p-Wert 1: Chi-Quadrat Test; testet ob Organisation und Pool statistisch von einander abweichen (dieses Semester). Je kleiner der p-Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied besteht. Die Statistik wird ab einer Mindestanzahl von 10 berechnet.